

O PROTOCOLO DE ACESSO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA



SUSPEITA DE NEOPLASIA (ANEMIA E/OU ANOREXIA E/OU PERDA DE PESO / VÔMITOS / DISFAGIA)
HEMORRAGIA DIGESTIVA (MELENA, ENTERORRAGIA, HEMATÊMESE, HEMATOQUEZIA)
SINAIS E SINTOMAS GASTROINTESTINAIS COM RISCO DE PERDA FUNCIONAL DE ÓRGÃO A CURTO PRAZO
(RISCO DE PERFURAÇÃO DE ÚLCERA, SÍNDROME PILÓRICA, MEGAESÔFAGO)
PRESENÇA DOS TRÊS SINAIS DE ALERTA EM AMARELO

SEGUIMENTO PÓS-TRATAMENTO (ESÔFAGO DE BARRETT, ÚLCERA, MEGAESÔFAGO, NEOPLASIA DO TRATO GASTROINTESTINAL)
SUSPEITA DE HIPERTENSÃO PORTAL
GRUPO DE PACIENTE VULNERÁVEL *COM INDICAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.
*IDOSO E/OU ESPECIAL (EX.: DEFICIENTE FÍSICO E/OU MENTAL, ACAMADO, DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, MORADOR DE RUA, USUÁRIO DE DROGA E/OU CRIANÇA E/OU GESTANTE)
PÓS-OPERATÓRIO DE GASTROPLASTIA (COM SINTOMAS DISPÉPTICOS)

CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE H. PYLORI APÓS 3 MESES DE TRATAMENTO ADEQUADO
SINAIS E SINTOMAS DO TRATO GASTROINTESTINAL PERSISTENTES COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA PRÉVIA
PRESENÇA DE 1 OU 2 COMORBIDADES
PRÉ-OPERATÓRIO DE GASTROPLASTIA

SINTOMAS DISPÉPTICOS SEM SINAIS DE ALARME
(EPIGASTRALGIA/PIROSE/ REGURGITAÇÃO)
SEM SINAIS DE ALERTA

OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0800 281 1520



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE